

---

## 6ª REGIONAL DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA

# RECOMENDAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 (NOVO CORONAVÍRUS)

### 1. ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE

- **O item 1.10 terá a seguinte redação:** Manter o agendamento dos atendimentos de pré-natal, puerpério e puericultura em horários diferentes dos atendimentos prestados às pessoas com condições agudas. Em relação às coletas de citopatológico de colo de útero, avaliar a possibilidade de reagendamento de acordo com a condição clínica da paciente;
- **O item 1.9 terá a seguinte redação:** os pacientes com Síndrome Gripal (febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Crianças menores de 2 anos: febre de início súbito e sintomas respiratórios – tosse, coriza e obstrução nasal - na ausência de outro diagnóstico específico) em acompanhamento ambulatorial na APS/ESF, devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. Os contatos domiciliares de pacientes com Síndrome Gripal (SG) confirmada também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso seja necessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo período dos 14 dias, com o CID10 –Z 20.9 contato com exposição a doenças transmissível não especificada. O médico deverá fornecer atestado mesmo para as pessoas do domicílio que não estiverem presentes na consulta da pessoa com sintomas. Caso o contato inicie com sintomas e seja confirmada SG, deverão ser iniciadas as precauções de isolamento para paciente, o caso notificado e o período de 14 dias deve ser reiniciado. O monitoramento deve ser realizado a cada 48 horas por meio telefônico ou presencial, de acordo com a avaliação clínica da equipe.
- **Incluso o item 1.13:** não há recomendação para a suspensão do aleitamento materno na transmissão de outros vírus respiratórios, recomenda que a amamentação seja

mantida em caso de infecção pelo COVID-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. Caso a mulher não se sinta segura em amamentar enquanto estiver com coronavírus, recomenda-se que seu leite seja retirado e ofertado à criança. Seguir as precauções segundo **NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-DAPES/SAPS/MS**.

#### **4. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO**

- **O item 4.1 terá a seguinte redação:** suspender os atendimentos odontológicos eletivos, mantendo-se o atendimento das urgências/emergências. Orientamos que estes profissionais poderão colaborar na realização da triagem e classificação dos usuários, seguindo o mesmo fluxo estabelecido pela equipe de atenção primária à saúde, contribuindo para a organização do serviço e diminuição da exposição de pessoas com usuários sintomáticos da COVID-19.
- **O item 4.2** será excluído.

#### **10 - NOTIFICAÇÃO DE CASOS**

- **O item 10.1 terá a seguinte redação:** A notificação imediata dos casos suspeitos, deve ser feita obrigatoriamente para a secretaria municipal de saúde e para a 6ª Regional de saúde/CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), através do telefone 41-99117-3500 e preencher o formulário próprio conforme link ([HTTP://bit.ly/notificaCOVID19](http://bit.ly/notificaCOVID19)). Ao preencher o formulário eletrônico de notificação baixar o pdf da ficha de notificação e enviar eletronicamente para [coecoronapr@gmail.com](mailto:coecoronapr@gmail.com).

#### **CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):**

- **O item definição de casos suspeitos terá a seguinte redação na situação 1**
  - **Situação 1 – VIAJANTE:** pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de qualquer país ou do estado de São Paulo ou Rio de Janeiro ou Santa Catarina E apresente: Febre ( $\geq 37,8$ ) E pelo menos um dos sinais ou sintomas


6ª REGIONAL DE SAÚDE UNIÃO DA VITÓRIA - PR  
Rua: Mal. Floriano Peixoto nº 180 -

Fone. (42) 3521-1750

respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O<sub>2</sub> < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) (figura 1); **OU**

***Estas recomendações poderão sofrer alterações conforme o cenário epidemiológico.***

***Cada município deverá construir seu plano de contingência para garantir assistência à saúde de seus municípios adaptado conforme as especificidades de seu território.***



**Ângela Maria Brzezinski**  
***Chefe DVAGS***



**Adriana Moreira de Castilho**

***Chefe DVVGS***

Equipe de Elaboração:

DVVGS/SCGE/SCVSAT/DVGAS/SCAERA/SCAPS/SCAFAR